

FICHE D'INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS

ALEMTUZUMAB (A-LEM-tooz-a-mab)

Autres appellations de ce médicament :

Campath® (*marque de commerce*)

Anticorps anti-CD52 (*autre appellation*)

Présentation :

Injection : Liquide sans couleur pour injection dans la circulation sanguine.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

L'alemtuzumab est utilisé pour le traitement de la leucémie. Il peut également être utilisé pour le traitement d'autres types de cancers.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Le médicament est préparé dans un sac pour perfusion intraveineuse et perfusé en un minimum de 2 heures

Précautions :

- Si vous prenez d'autres médicaments, il est important d'en aviser votre médecin. Si vous prenez des médicaments pour abaisser votre tension artérielle, vous pourriez devoir attendre d'avoir subi le traitement avec Alemtuzumab avant de prendre votre dose. Veuillez communiquer avec votre médecin avant de venir subir le traitement.
- Certains patients pourront avoir une réaction, souvent seulement avec la première dose de Alemtuzumab. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre et des frissons, de la fatigue ou des maux de tête; des symptômes moins communs peuvent inclure les nausées, des démangeaisons, des douleurs thoraciques, yeux qui coulent ou gonflement de la gorge. L'infirmière vous surveillera de près pendant la perfusion, tout particulièrement au début de celle-ci. L'Alemtuzumab vous sera donné lentement. Avisez votre infirmière si vous avez des sensations ou symptômes inhabituels, au moment où ils se produisent.
- Vous pouvez vous sentir étourdi ou faible une fois la perfusion terminée. Vous devriez prendre des mesures pour qu'une autre personne vous reconduise à la maison après les traitements.
 - Vous ne devriez pas suivre cette chimiothérapie si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il est important de discuter des méthodes contraceptives avec votre médecin (remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser seulement les contraceptifs oraux comme méthode contraceptive). Si vous êtes un homme qui prend ce médicament, vos partenaires féminines devraient aussi utiliser des méthodes contraceptives.
 - Si vous êtes atteint de la varicelle (ou que vous avez récemment été exposé à une personne atteinte), du zona, de troubles rénaux ou du foie, avisez-en votre médecin. Ces problèmes de santé peuvent avoir un effet sur le traitement avec ce médicament.
 - En raison du risque accru d'infection, consultez votre médecin avant de recevoir un vaccin. Consultez votre médecin avant de subir une chirurgie ou des travaux de dentisterie.
 - Ne prenez pas d'ASA sans que votre médecin le sache et sans son consentement.
 - Si un médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA pour prévenir les maladies cardiaques ou les AVC, veuillez en discuter avec votre oncologue (médecin traitant le cancer) avant de commencer un traitement.
 - N'utilisez pas d'ASA (aspirine, acide acétylsalicylique) pour soigner un mal de tête, une fièvre ou des douleurs occasionnelles; utilisez plutôt l'acétaminophène (Tylenol). Bon nombre de médicaments sans ordonnance contiennent de l'ASA; demandez toujours conseil à un pharmacien lorsque vous choisissez un produit.

EFFETS SECONDAIRES**PRÉVENTION****CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE****PLUS COURANTS :**

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection/de fièvre, frissons, toux • Diminution du nombre de globules blancs | <ul style="list-style-type: none"> • Limitez vos contacts avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez-vous souvent. Lavez-vous souvent les mains. | <ul style="list-style-type: none"> • Conservez un thermomètre à la maison. Apprenez à reconnaître les signes d'infection. Téléphonez immédiatement à votre médecin si votre température est supérieure à 38°C ou 100°F. Vous pourriez avoir besoin d'antibiotiques. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ecchymoses ou saignements. Selles noires, comme du goudron. Points rouges sur la peau. • Fatigue ou faiblesse • Manque d'énergie | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez les objets coupants avec soin. Utilisez une brosse à dents souple. Consultez votre médecin avant de faire exécuter des travaux de dentisterie. | <ul style="list-style-type: none"> • En cas de saignements ou d'ecchymoses inhabituels ou incessants, téléphonez immédiatement à votre médecin ou présentez-vous à l'urgence. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de faiblesse • Hypotension artérielle | <ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous souvent. Faites des siestes au besoin. Mangez des repas bien équilibrés. Des exercices légers, comme de la marche, peuvent aider. | <ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous quand vous vous sentez fatigué ou faible. Ne conduisez pas de véhicule moteur et n'utilisez pas de machinerie. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nausées et vomissements | <ul style="list-style-type: none"> • Sortez lentement du lit • Parlez à votre médecin si vous prenez des médicaments contre l'hypertension (si vous prenez généralement ces médicaments) • Prenez des médicaments prescrits pour soigner les nausées et vomissements. Continuez de boire des liquides transparents. Prenez l'air et reposez-vous. Consultez la brochure <i>Nausées et vomissements</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Téléphonez à votre médecin si les sensations causées par l'hypotension artérielle vous incommode. • Ne conduisez pas de véhicule si vous vous sentez faible • Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antivomitifs, vous pouvez prendre une autre dose. Si vous ne pouvez garder les comprimés, un suppositoire pourra vous être prescrit. Téléphonez à votre médecin si les vomissements persistent pendant plus de 24 heures ou les nausées pendant plus de 48 heures. |

MOINS COURANTS :

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs dans les articulations, os, muscles ou dans le dos | <ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous souvent. Mangez des repas bien équilibrés. Des exercices légers peuvent aider. | <ul style="list-style-type: none"> • Prenez 1 à 2 capsules d'acétaminophène (Tylenol, par exemple) toutes les 4 heures, au besoin, contre la douleur. • Si la douleur ou les maux de tête vous incommode encore après 2 à 4 jours, communiquez avec votre médecin ou infirmière. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhée | <ul style="list-style-type: none"> • Évitez de consommer des aliments chauds, épicés et frits; évitez de consommer des aliments et des boissons contenant de la caféine. | <ul style="list-style-type: none"> • Buvez beaucoup de liquide. Téléphonez à votre médecin si la diarrhée persiste pendant plus de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. |

RARES :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rythme cardiaque élevé/irrégulier; crise épileptique; mouvements incontrôlés, ▪ Changements d'humeur; respiration difficile; gonflement des pieds. | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez IMMÉDIATEMENT avec votre médecin! |
|---|---|